

매년 3월 24일은
결핵예방의 날입니다!

2주이상 기침하면 결핵검사

올바른 기침예절 실천



기침할 땐 손이 아닌
휴지나 손수건으로
입과 코를 가리고 합니다.



휴지나 손수건이 없을 때는
옷소매 위쪽으로 입과 코를
가리고 합니다.




기침을 한 후에는
흐르는 물에 비누로
손을 씻어야 합니다.

결핵, 바로알고 대처하기



2주 이상
기침하면
결핵검사



기침예절
실천



결핵예방접종
(BCG접종)



365
14

365일
결핵예방

결핵 Tuberculosis 이란?

결핵은 결핵균(*Mycobacterium tuberculosis*)의 감염에 의해 생기는 호흡기 질환입니다. 주로 폐에 발생하지만 다른 신체부위에도 질환을 일으킬 수 있습니다.

결핵의 감염경로?

전염성 결핵환자의 기침, 재채기 또는 대화 등을 통해 배출된 결핵균이 공기를 통해 다른 사람의 폐로 들어가게 되면 결핵균에 감염됩니다.

*결핵은 호흡기를 통하여 전염되므로 환자가 사용하는 물건을 함께 쓰셔도 괜찮습니다. 또한, 음식을 나누어 먹게되거나 타액으로는 전염이 되지 않습니다.

결핵의 증상과 치료

주요 증상

2주 이상 기침, 발열, 수면 중 식은땀, 체중감소 등

치료

6개월 이상 치료하면 완치가 가능하며, 치료 시작 후 약 2주가 경과하면 전염성이 손실됩니다.

결핵의 진단 방법

흉부 X선 검사

- 흉부 X선 검사에서 결핵이 의심되면 결핵의 확진을 위해 객담검사를 실시합니다.
- 결핵진단에 유용한 검사법이지만 단독으로 결핵을 진단하지는 않습니다.

가래(객담)검사

가래(객담)검사서 결핵균이 검출되면 결핵으로 진단할 수 있습니다.

결핵예방접종(BCG접종) 바로 알기

우리나라에서는 생후 1개월 이내의 모든 신생아에게 BCG백신을 접종하도록 권고하고 있으며, 예방접종을 통해 소아에서 발생가능성이 높은 중증 결핵을 예방할 수 있습니다.

결핵예방접종(BCG접종)은 소아의 심각한 중증 결핵예방을 위해 접종하는 것으로, 예방접종만으로 결핵이 평생 동안 예방되는 것은 아닙니다.